

Épocas de Tratamento em Milho

Fases do Milho												
		Antes da sementeira	Sementeira	Emergência	1 Folha	2 Folhas	3 Folhas	4 Folhas	5 Folhas	6 Folhas		
Problemas		Semente tratada										
Insectos de solo (alfinetes)	Pré-emergência e pós-emergência precoce Gramíneas e Dicotiledóneas (máx. 2 folhas, acção residual e foliar)	Roundup UltraMax (0,75-6 L/ha)	Adengo (0,33-0,44 L/ha) ⁽¹⁾									
			Aspect (2,5 L/ha) ⁽¹⁾									
	Pós-emergência Pós-emergência precoce Gramíneas e Dicotiledóneas (2-4 folhas, acção foliar e residual)							Monsoon Active (1,5-2 L/ha) ⁽²⁾				
								Capreno (0,22-0,29 L/ha + 1-1,5 L/ha Biopower *) ⁽³⁾				
								Aspect + Laudis ⁽⁴⁾ (2,5 L/ha + 1,5 L/ha)				
								Option (2-2,5 L/ha) ⁽⁵⁾				
						Laudis (1,7-2,25 L/ha) ⁽⁶⁾						
Insectos	Roscas				Decis Expert (75-100 ml/ha)							
	Brocas						Coragen (100-150 ml/ha) ou Decis Expert (125 ml/ha)					

(1) **Adengo + Aspect**: possibilidade de mistura de tanque complementar (consultar os serviços técnicos da Bayer); (2) **Monsoon Active**: indicado para o controlo precoce de um largo espectro de infestantes anuais, com acção foliar e residual, incluindo forte supressão e paragem de crescimento de algumas vivazes (sorgo-bravo, junça, corriola, grama, etc.); (3) **Capreno**: indicado para o controlo precoce de um largo espectro de infestantes anuais, com acção foliar e residual, com menor dependência da humidade no solo; (4) **Aspect + Laudis**: indicado para o controlo precoce de um largo espectro de infestantes anuais, com acção residual; (5) **Option**: indicado para o controlo de infestantes gramíneas (milhãs, nomeadamente *Setaria* spp. e sorgo-bravo) e algumas dicotiledóneas anuais. (6) **Laudis**: indicado para o controlo de um largo espectro de infestantes dicotiledóneas e gramíneas anuais (milhãs, nomeadamente milhã-digitada). ***Biopower** substitui **Genapol**.